




丛石鸻 55厘米 留鸟

眼大



夜间活动,见于北部
东北部的树林中,
南部数量下降

滩石鸻 55厘米 留鸟

喙巨大

翼上有深色长纹



海滩,潮泥滩,
以及澳洲东北
部的小岛上

鸡冠水雉 21厘米 留鸟



热带有很多浮于水
面的水生植物的
淡水湿地

脚大,
适于在莲叶
上行走

黄色大肉垂

叫声大而尖

(澳洲北部)

装脸麦鸡 34厘米 留鸟

短草类栖息地,
湿地边缘,城市



(澳洲东部)

鲜红色
小肉垂

三色麦鸡 27厘米 留鸟

澳大利亚南半部开
阔的短草草原,半荒原

正面看其粗
黑的胸部条
纹呈U形



喙大

灰斑鸻 29厘米 候鸟

繁殖期成鸟

繁殖期成鸟

金斑鸻 25厘米 候鸟




非繁殖期成鸟


沿海潮泥滩和沙质潮间带,
在潮间沼泽中的宽叶草本植
物中或农场上筑巢



非繁殖期成鸟

沿海潮泥滩和沙质潮间带





澳洲斑蛎鹬 46厘米 留鸟

沿海潮泥滩和沙质潮间带



乌蛎鹬 46厘米 留鸟

沿海石滩和小石岛



在浅水中用细长上翘的喙左右扫动觅食

红颈反嘴鹬 44厘米 留鸟

尤其发现于咸水湖中,但也发现于淡水湿地和海边潮间带



腿浅蓝色

腿很长,粉红色

黑翅长脚鹬 37厘米 留鸟

各种内陆咸水,淡水湿地和海边潮间带



斑长脚鹬 39厘米 留鸟

大而密的鸟群出现于咸水湖



叉尾

普通燕鸻 24厘米 候鸟

澳大利亚北部的开阔草原和洪泛平原



喉部有明显条纹

两种燕鸻在飞行中捕捉昆虫,飞行优雅,象燕鸻

腿短

澳洲彩鹬 27厘米 留鸟



飞行时腿长于方形的尾

胸栗色

长腿燕鸻 21厘米 留鸟

澳大利亚干旱内陆中的草原和乱石平原



雄鸟

雌鸟

浅的淡水沼泽
白天安静地藏于植被中
黄昏时逐渐活跃



面部有条纹

喙长

澳南沙锥 31厘米 候鸟

分布于澳洲东部浅的淡水沼泽
突然从隐藏中出现,进行快速的
忽东忽西的飞

另外两种沙锥,大沙锥和针尾沙锥在澳洲北部和西部有小数量发现,但很难把它们和彼此以及和澳南沙锥区别开来



眼睛周围有宽的白条

非繁殖期成鸟

林鹬 21厘米 候鸟

富有水生植物的
浅淡水沼泽

矶鹬 20厘米 候鸟

翅膀前端与
深色前胸
间有一段白色

在海边内陆湿地的
多石边缘或泥坡
单只出现,也出现
于水沟、河道和水库

阔嘴鹬 17厘米 候鸟

潮泥滩

翘嘴鹬 23厘米 候鸟

喙上翘,喙基桔色

喙长,下弯

非繁殖期成鸟

弯嘴滨鹬
20厘米 候鸟

沿海潮间带,
内陆咸水淡水沼泽

尖尾滨鹬
20厘米 候鸟

沿海潮间带和内
陆咸水淡水沼泽

非繁殖期成鸟

繁殖期成鸟

繁殖期成鸟


斑胸滨鹬 21厘米 候鸟

非繁殖期成鸟

胸部布满条纹,

喙基发黄

头顶红褐色



植被丰富的咸水,淡水湿地的泥质边缘